

លំដាប់ ORDER: GONORYNCHIFORMES

មានមួយអម្បូរគឺ Chanidae ត្រូវបានដឹងថាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
A single family, Chanidae is known in Cambodia

អម្បូរ FAMILY: CHANIDAE

មានតែមួយពួក និងមួយប្រភេទ *Chanos chanos* ត្រូវបានដឹងថា មានរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកភ្លាវ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
A single genus and species *Chanos chanos* is known from Cambodian estuaries

ត្រី នួនចាន់

Chanos chanos (Forsskal, 1775)

កូនត្រី និងត្រីពេញវ័យ
រស់នៅក្នុងសមុទ្រ

Adults and larvae live in the sea

កូនត្រីចូលក្នុងតំបន់ទឹកភ្លាវ
Juveniles enter estuaries


ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ
ប្រហែល < ១០០ ស.ម

Common size
< about 100 cm SL

ជាទូទៅដងខ្លួនរាងស្រលូន ពណ៌ប្រាក់
Body plain silver, streamlined shape

មាត់តូចគ្មានធ្មេញ
Mouth small without teeth

ព្រួយកន្ទុយរែក
Caudal fin forked



លំដាប់ ORDER: CYPRINIFORMES

យ៉ាងហោចណាស់មានប្រាំបួនអម្បូរគឺ Cyprinidae, Gyrinocheilidae, Gastromyzontidae, Balitoridae, Cobitidae, Botiidae, Vaillantellidae, Serpenticobitidae និង Nemacheilidae
ត្រូវបានដឹងថាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

At least 9 families including Cyprinidae, Gyrinocheilidae, Gastromyzontidae, Balitoridae, Cobitidae, Botiidae, Vaillantellidae, Serpenticobitidae and Nemacheilidae are known in Cambodia

អម្បូរ FAMILY: CYPRINIDAE

មានហ៊ុកសិបពួកត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះ
Sixty genera are shown here

ត្រី ចង្វាក់ឃី

Laubuka siamensis Fowler, 1939


ខ្លួនហាប់ ខ្ពស់ល្មម
Body compressed,
moderately deep

KH

LA

TH

VN



រស់នៅក្នុងបឹង និងទន្លេ

Inhabits lakes and rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៦ ស.ម


Common size < 6 cm SL

ទ្រនុងពោះស្រួចចន្លោះពីព្រុយទ្រូង និងវន្ធកូទ
Abdominal keel between pectoral and anus

ត្រី ចង្វាក់ឃីធំ

Laubuka caeruleostigmata Smith, 1931

ចំណុចខៀវនៅលើក្បាល
A blue spot on head



KH

LA

TH

VN

ខ្លួនហាប់ ខ្ពស់ខ្លាំង


Body compressed, very deep

រស់នៅក្នុងទន្លេធំៗ

Inhabits large rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៥.១ ស.ម

Common size < 5.1 cm SL




ទ្រនុងពោះស្រួចចន្លោះ
ព្រុយទ្រូង និងពោះ
Keeled between pectoral
and pelvic fins

Photo by T. Sato


ត្រី ស្លឹកឫស្សី

Oxygaster pointoni (Fowler, 1934)




ត្រី ស្លឹកឫស្សីធំ

Paralaubuca typus Bleeker, 1864




ត្រី ស្លឹកឫស្សីតូច

Paralaubuca barroni (Fowler, 1934)




ត្រី ចន្ទាសភ្នក

Parachela siamensis (Günther, 1868)




ត្រី ចន្ទាសភ្នកព្រួយ

Parachela oxygastroides (Bleeker, 1852)



ត្រី ចន្ទាសភ្នកប្រាក់

Parachela williaminae Fowler, 1934



ត្រី ចន្ទាស័ក្កកពោត

Parachela maculicauda (Smith, 1934)

គល់ព្រួយខ្នង នៅចំគល់ព្រួយគូទ
Dorsal fin origin above anal fin origin

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹង
Inhabits lakes and rivers


ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅប្រហែល ៤.២ ស.ម
Size to about 4.2 cm SL

KH LA TH VN

លឿង
Yellow

ខ្មៅ
Black

ទ្រនុងពោះស្រួច
Abdominal keel present



ត្រី ចន្ទាស័ក្កកស

Parachela sp.

គល់ព្រួយខ្នង ស្ថិតនៅក្រោយគល់ព្រួយគូទ
Dorsal origin behind anal origin


រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹង
Inhabits lakes and rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៥.១ ស.ម
Common size < 5.1 cm SL

KH LA TH

ទ្រនុងពោះស្រួច
Abdominal keel present

ស្រកាខ្សែឆ្នូតចំហៀងមាន ៦០
About 60 lateral line scales



ត្រី ចង្វាឫស្សី

Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1955)

ស្រកាខ្សែឆ្នូតចំហៀងមាន ៤៨-៥២
48–52 lateral line scales

ប្រហែលជាអាចនាំចូលពីប្រទេសចិន
Possibly introduce via China

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹង
Inhabits lakes and rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ១៦ ស.ម
Common size < 16 cm SL

KH

ទ្រនុងចុងក្រោយមិនបែក និងរឹង
Last simple ray hard


ទ្រនុងទន់បែក ១០-១៤
10–14 branched rays

Abdominal keel present




ត្រី ដងខ្លែង

Macrochirichthys macrochirus (Valenciennes, 1844)




ត្រី សកាកែវ


Raiamas guttatus (Day, 1870)



ត្រី បង្គុយ


Luciosoma bleekeri Steindachner, 1878






ត្រី ចង្វាអង្កត់

Opsarius koratensis (Smith, 1931)



ត្រី ចង្វាអង្កត់ធំ

Opsarius pulchellus (Smith, 1931)



ត្រី ចង្វាភ្លៀងភ្នំ

Danio albolineatus (Blyth, 1860)

រស់នៅក្នុងស្ទឹងទឹកសាប
Inhabits freshwater streams

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៤ ស.ម
Common size < 4 cm SL

KH LA TH VN



ឱ្យឆ្លុះពណ៌ទឹកក្រូច
An orange stripe on posterior half of body

ពុកមាត់ ២គូ
2 pairs of barbels

ត្រី ចង្វាភ្លៀងភ្នំ

Danio cf. pulchra

រស់នៅក្នុងស្ទឹងទឹកសាប
Inhabits freshwater streams

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានដឹងថា មានតែនៅភាគខាងលិចដល់ជួរភ្នំក្រវាញប៉ុណ្ណោះ
In Cambodia, known only from west to Cardamom range

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួន < ៣.២ ស.ម
Size to < 3.2 cm SL

KH VN



ឆ្លុះពណ៌ទឹកក្រូចពីរ ដល់ខាងក្រោយក្បាល
Two orange stripes to behind head

ត្រី ចង្វាភ្លៀងស្រែ

Esomus longimanus (Lunel, 1881)

KH

រស់នៅតាមបឹង និងទន្លេធំៗ

Inhabits lakes and large rivers

ជាទូទៅមិនសូវសម្បូរ

Not commonly found

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅប្រហែល < ៦ ស.ម

Common size < about 6 cm SL

រន្ធកូទ

Anus

ចុងព្រយទ្រូងដល់រន្ធកូទ

Pectoral fin tip reaching anus

Photo by T. Sato

ត្រី ចង្វាភ្លៀងឆ្នុត

Esomus metallicus Ahl, 1923

KH

LA

TH

VN

រស់នៅតាមវាលស្រែ បឹង និងស្ទឹងតូចៗ

Inhabits rice fields, lakes and small streams

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៥.៥ ស.ម



Common size < 5.5 cm SL

ព្រយទ្រូងវែងមិនដល់រន្ធកូទ

Pectoral fin not reaching anus

រន្ធកូទ

Anus




ត្រី ចង្វាតូច

Rasbora amplistriga Kottelat, 2000




ត្រី ចង្វាភ្នំ

Rasbora paviana Tirant, 1885




ត្រី ចង្វាស៊ីត

Rasbora cf. daniconius




ត្រី ចង្វាស

Rasbora myersi Brittan, 1954




ត្រី ចង្វាមូល

Rasbora aurotaenia Tirant, 1885



ត្រី ចង្វាផ្កាឈូក

Rasbora tornieri Ahl, 1922



ត្រី ចង្វាពោត

Rasbora trilineata Steindachner, 1870

KH LA TH



រស់នៅតាមទន្លេ និងបឹង
Inhabits rivers and lakes


ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅប្រហែល < ៦ ស.ម
Common size < about 6 cm SL

ឆ្លុះខ្មៅនៅផ្នែកទាំងពីរនៃព្រួញកន្ទុយ
Two black subterminal stripe on both lobe of caudal fin

ត្រី ចង្វាពោតតូច

Rasbosoma spilocerca (Rainboth & Kottelat, 1987)

KH LA TH



រស់នៅក្នុងវាលភក់ល្អាប់លិចទឹក និងបឹង
Occurs in swamps and lakes

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនប្រហែល ២.៦ ស.ម
Size to about 2.6 cm SL


អុតខ្មៅ
Black spot

អុតខ្មៅ
Black spot

អុតខ្មៅបីនៅលើព្រួញកន្ទុយ
Three black spots on caudal fin


ត្រី ចង្វាល្អិត

Boraras micros Kottelat & Vidthayanon, 1993




ត្រី ចង្វាក្រហម

Boraras urophthalmoides (Kottelat, 1991)



ត្រី ចង្វាក្រហម

Trigonostigma espei (Meinken, 1967)



ត្រី ចង្វាឆ្មុតពីរ *Trigonopoma pauciperforatum* (Weber & de Beaufort, 1916)


មានរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកនឹង ឬទឹកហូរយឺតៗ ព្រមទាំងមានជាតិអាស៊ីតខ្សោយ
Found in sluggish or standing waters with mild acidity

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៣.៥ ស.ម
Common size < 3.5 cm SL

ខ្លួន និងក្បាលស្រឡូន
Body and head slender

ខ្សែឆ្មុតចំហៀងមិនពេញលេញ ដោយស្រកាមានរន្ធតែ ៥-១០
Lateral line incomplete, having only 5—10 pored scales

KH VN



ឆ្មុតពីច្រមុះដល់គល់កន្ទុយ
Stripe from snout to caudal base

ត្រី ចង្វាស្រែ *Amblypharyngodon chulabhornae* Vidthayanon & Kottelat, 1990

រស់នៅតាមវាលស្រែ និងស្ទឹង
Inhabits rice fields and streams

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ
ប្រហែល < ៤ ស.ម
Common size < about 4 cm SL

ខ្សែឆ្មុតចំហៀងមិនពេញលេញដោយស្រកាមានរន្ធ ៦-៧
Incomplete lateral line with 6—7 pored scales

KH LA TH VN



ខ្នងពណ៌បៃតងក្លាវ ពោះពណ៌ស
Back olive, belly white


ត្រី លិញ *Thynnichthys thynnoides* (Bleeker, 1852)

រស់នៅក្នុងបឹង និងទន្លេ
Inhabits lakes and rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ១៤.៥ ស.ម
Common size < 14.5 cm SL

ស្រកាខ្សែឆ្មុតចំហៀង ៥៧-៦០
57—60 lateral line scales

KH LA TH VN




ខ្លួនខ្ពស់ ពណ៌ប្រាក់លាត
Body deep, plain silver

ស្រកាតូចៗ
Scales very small


ត្រី កាបស

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)




ត្រី កាបក្បាលធំ

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)



ត្រី កាបស៊ីស្មៅ

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)




ត្រី គល់រាំង

Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898

ក្បាលធំ ៣៣-៤០% នៃប្រវែងដងខ្លួន
Head large (HL 33–40 % in SL)

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹងធំៗ
Inhabits large rivers and lakes

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនដល់ ២៥០ ស.ម
Attains 250 cm SL



KH LA TH VN

ទ្រនុងទន់បែក ៩
9 branched rays

ត្រី គ្រីខ្មៅ

Gibelion catla (Hamilton, 1822)


មានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌា
Originated from India

នាំចូលមកសំរាប់ការវិវត្តកម្ម
Introduced for aquaculture

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួន
អាចដល់ ១៨០ ស.ម
Size to about 180 cm TL

ខ្លួនខ្ពស់ ហាប់
Body deep,
compressed

ស្រកាខ្សែឆ្មុតចំហៀងមាន ៣៨-៤២
38—42 lateral line scales



KH LA TH VN

ទ្រនុងទន់បែក ១៤-១៦
14–16 branched
rays

ត្រី ច្រឡឹង ឬត្រីព្រលួង


Leptobarbus rubripinna (Fowler, 1937)

កូនត្រី
Juvenile

រស់នៅតាមបឹង និងទន្លេ
Inhabits lakes and rivers

ធ្លាប់នៅក្នុងវារីប្រកម្ម
Used in aquaculture

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនអាចដល់ប្រហែល ៥០ ស.ម
Size up to about 50 cm SL




KH LA TH VN

ព្រួញក្រហម
Fins red

ត្រី គុជ្រា

Puntioplites bulu (Bleeker, 1851)



ខ្សែខ្មៅបញ្ជិត
Oblique black lines

KH

VN


រស់នៅក្នុងទន្លេធំៗ
Inhabits large rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនដល់ ៣៣.៥ ស.ម
Size to 33.5 cm SL

ទ្រនុងព្រួយរឹងគួររលោង
Anal spine smooth

ត្រី ច្រកែងក្លោង

Puntioplites falcifer Smith, 1929



ទ្រនុងរឹងខ្លាំងបំផុត
Very long dorsal spine

KH

LA

TH

ខ្លួនពណ៌ប្រាក់
Body plain silver

ស្រកាជុំវិញគល់កន្ទុយមាន ១៦
16 circumpeduncular scales


រស់នៅក្នុងទន្លេធំៗ
Inhabits large rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ
ប្រហែល ៣៥ ស.ម
Size to about 35 cm SL

ទ្រនុងព្រួយរឹងគួរមានធ្មេញ
Anal spine serrated

ត្រី ច្រកែង

Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1864)




ស្រកាជុំវិញគល់កន្ទុយមាន ១៨-២០
18—20 circumpeduncular scales

រស់នៅក្នុងបឹង និងទន្លេ
Inhabits lakes and rivers


ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅប្រហែល < ២១ ស.ម
Common size < about 21 cm SL

ទ្រនុងព្រួយរឹងគួរមានធ្មេញ
Anal spine serrated

ត្រី ប៉ាធាត់ *Scaphognathops bandanensis* Boonyaratpalin & Srirungroj, 1971




ត្រី ប៉ាភៀន *Scaphognathops stejnegeri* (Smith, 1931)




ត្រី កាហៃ

Barbonymus altus (Günther, 1868)




ត្រី កាហៃលឿង

Barbonymus schwanefeldii (Bleeker, 1854)



ត្រី ឆ្លិនប្រាក់

Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849)



ត្រី ឆ្កិនស្ទឹង

Hypsibarbus suvattii (Rainboth, 1996)

ស្រកាបញ្ឈរ ៤ ចន្លោះស្រកាមុខព្រុយខ្នង និងស្រកាខ្សែឆ្នូតចំហៀង

4 scale rows between mid-predorsal scale row and lateral line scales

រស់នៅក្នុងទន្លេធំៗ

Inhabits large rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ២០ ស.ម

Common size < about 20 cm SL


KH
LA
TH
VN

ស្រកាជុំវិញគល់កន្ទុយមាន ១៤

14 circumpeduncular scales

ទ្រនុងទន់បែក ៥

5 branched rays



ត្រី ឆ្កិនក្រហម

Hypsibarbus vernayi (Norman, 1925)

គល់ធ្មេញទ្រនុងព្រុយខ្នង មានចន្លោះ well-spaced

Serrated teeth of dorsal spine well-spaced

រស់នៅក្នុងទន្លេធំៗ

Inhabits large rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ ប្រហែល < ២១.៦ ស.ម

Size to about 21.6 cm SL


KH
LA
TH

ស្រកាជុំវិញគល់កន្ទុយមាន ១៤

14 circumpeduncular scales

ទ្រនុងទន់បែក ៥

5 branched rays



ត្រី ឆ្កិនមាស

Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931)

គល់ធ្មេញទ្រនុងព្រុយខ្នងកៀកគ្នា

Serrated teeth of dorsal spine close-set

រស់នៅក្នុងទន្លេធំៗ

Inhabits large rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ ប្រហែល ២០ ស.ម

Size to about 20 cm SL


KH
LA
TH

ស្រកាជុំវិញគល់កន្ទុយមាន ១៤

14 circumpeduncular scales


ទ្រនុងទន់បែក ៥

5 branched rays




ត្រី ឆ្កែមូល

Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1945)




ត្រី ឆ្កែធំ

Hypsibarbus lagleri Rainboth, 1996




ត្រី ក្រស្នំ

Poropuntius normani Smith, 1931




ត្រី ក្រោរ

Tor tambroides (Bleeker, 1854)




ត្រី ក្រោរ

Tor tambra (Valenciennes, 1842)



ត្រី ក្រោរខ្មៅ

Neolissochilus soroides (Duncker, 1904)



ត្រី ខ្មាន់ស


Hampala dispar Smith, 1934

រស់នៅតាមទន្លេ និងបឹង
Inhabits lakes and rivers

អុចខ្មៅមូល
Round black spot

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនដល់ប្រហែល ៣២ ស.ម
Size to about 32 cm SL

ពុកមាត់ខ្លីជាងអង្កត់ផ្ចិតភ្នែក
Barbel shorter than eye diameter



KH LA TH VN

ត្រី ខ្មាន់


Hampala macrolepidota Kuhl & van Hasselt, 1823

រស់នៅតាមទន្លេ និងបឹង
Inhabits lakes and rivers

អង្កត់ខ្មៅ
A black bar

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនដល់ប្រហែល ៦០ ស.ម
Size to about 60 cm SL

ពុកមាត់វែងជាងអង្កត់ផ្ចិតភ្នែក
Barbel longer than eye diameter



KH LA TH VN

ត្រី អង្កត់ប្រាក់ស្ទឹង

Barbodes aurotaeniatus (Tirant, 1885)

កូនត្រី
Juvenile

អុចខ្មៅច្រើន
Many dark spots

រស់នៅតាមស្ទឹង ប្រឡាយ
Inhabits streams and canals

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនដល់ប្រហែល ៦.៣ ស.ម
Size to about 6.3 cm SL

ពុកមាត់ ១គូ
A pair of barbels



KH LA TH VN

ត្រី អង្កត់ប្រាក់ភ្នំ

Barbodes rhombeus (Kottelat, 2000)

KH LA TH VN


កូនត្រី
Juvenile

អុចខ្មៅច្រើន
Many dark spots

រស់នៅតាមស្ទឹង
Inhabits streams

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ ៨ ស.ម
Common size < about 8 cm SL

ពុកមាត់ ២ គូ
2 pairs of barbels



ត្រី អង្កត់ប្រាក់

Puntius brevis (Bleeker, 1849)

KH LA TH VN


រស់នៅក្នុងទឹកនឹង ឬ ហូរយឺតៗ មានវារីរុក្ខជាតិ
Inhabits standing or sluggish waters with vegetation

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ ៨ ស.ម
Common size < 8 cm SL

ពុកមាត់មួយគូខ្លី
A pair of short barbels

ឈ្មោលមានឆ្និតចំហៀងខ្លួនពណ៌ទឹកក្រូច
An orange mid-lateral stripe in males

អុចខ្មៅ
A black spot



ត្រី អង្កត់ប្រាក់ក្រហម

Puntius masyai Smith, 1945

KH LA TH VN

រស់នៅក្នុងទឹកនឹង ឬហូរយឺតៗ មានវារីរុក្ខជាតិ
Inhabits standing or sluggish waters with vegetation


ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនដល់ប្រហែល ៥.៥ ស.ម
Size to about 5.5 cm SL

ពុកមាត់មួយគូខ្លី
A pair of short barbels

អុចខ្មៅកណ្តាលគល់ព្រុយខ្នង
A black spot at base of dorsal fin rays


អុចខ្មៅ
A black spot

សំណាកពីប្រទេសឡាវ
Specimen from Laos




ត្រី អំពិលទុំ

Systomus rubripinnis (Valenciennes, 1842)




ត្រី បីកំណាត់

Puntigrus partipentazona (Fowler, 1934)




ត្រី អង្កត់ខ្លា

Desmopuntius pentazona (Boulenger, 1894)




ត្រី អង្កត់ប្រាក់តូច

Parasikukia maculata Doi, 2000




ត្រី ភ្នែកក្រហម

Sikukia gudgeri (Smith, 1934)




ត្រី កន្ទុយលឿង

Sikukia stejnegeri Smith, 1931




ត្រី កំបុតច្រមុះ

Amblyrhynchichthys micracanthus Ng & Kottelat, 2004




ត្រី កំពូលបាយ

Cosmochilus harmandi Sauvage, 1878




ត្រី ឆ្កែក

Cyclocheilos enoplos (Bleeker, 1849)




ត្រី ស្រកាត្តាមក្រហម

Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842)




ត្រី ស្រកាត្តាមធំ

Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853)



ត្រី ស្រកាត្តាមតូច

Cyclocheilichthys lagleri Sontirat, 1985



ត្រី ស្រកាភ្លាមពុកមាត់

Cyclocheilichthys armatus (Valenciennes, 1842)

រស់នៅតាមបឹង និងទន្លេ
Inhabits lakes and rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនដល់ទៅ ១៨ ស.ម
Size to 18 cm SL

ជាធម្មតាពុកមាត់១គូខ្លី
Usually a pair of short barbels

ស្រកាជុំវិញគល់កន្ទុយមាន ១៦
16 circum peduncular scales

KH TH VN

ត្រី ស្រកាភ្លាមពុកមាត់បី

Cyclocheilichthys heteronema (Bleeker, 1854)

រស់នៅតាមបឹង និងទន្លេ
Inhabits lakes and rivers


ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៥ ស.ម
Common size < 5 cm SL

ពុកមាត់បែកច្រើន
Barbels branched

KH LA TH


ត្រី ទឹមព្រឹកឆ្នុង

Mystacoleucus atridorsalis Fowler, 1937




ត្រី ទឹមព្រឹក

Mystacoleucus greenwayi Pellegrin & Fang, 1940



ត្រីទឹមព្រឹក

Mystacoleucus obtusirostris (Valenciennes, 1842)



ត្រី កន្ទុយក្រហម

Discherodontus ashmeadi (Fowler, 1937)


រស់នៅតាមទន្លេ និងស្ទឹង
Inhabits streams and rivers

ស្នាមខ្មៅមួយនៅចុងព្រួញខ្នង
A black blotch at tip of dorsal fin

KH LA TH

ជាទូទៅប្រវែងដងខ្លួន < ១១ ស.ម
Common size < about 11 cm SL

ពូកមាត់ ២គូ
2 pairs of barbels



ស្នាមក្រហម
Red markings

ត្រី ឆ្កោកទីទុយ

Albulichthys albuloides (Bleeker, 1855)

ខ្លួនស្រលូន ពណ៌ប្រាក់
Body slender, plain silver

KH LA TH VN

ភ្នែកគ្របដោយគ្របកភ្នែកខ្លាញ់
Eyes covered with adipose eyelid

រស់នៅបឹង និងទន្លេ
Inhabits lakes and rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ២០ ស.ម
Common size < about 20 cm SL



ពណ៌ទឹកក្រូច
Orange

ត្រី កាបសាម៉ាញ់

Cyprinus rubrofusculus Lacepède, 1803

ស្រកាខ្សែឆ្នូតចំហៀងពី ២៩-៣៣
29-33 lateral line scales


KH LA TH VN

ប្រហែលជាអាចនាំចូលពីប្រទេសចិន
Possibly introduced from China

ធ្លាប់នៅក្នុងវារីវប្បកម្ម
Used in aquaculture


ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនអាចដល់ទៅ ២៨ ស.ម
Size to at least 28 cm SL

ទ្រនុងទន់បែក ១៨-៣៣
18-22 branched rays




ត្រី ត្រសក់

Probarbus jullieni Sauvage, 1880




ត្រី ត្រសក់ស

Probarbus labeamajor Roberts, 1992




ត្រី អណ្តាតពីរ ឬ រៀលថ្ម

Barbichthys laevis (Valenciennes, 1842)




ត្រី ខ្នងវែង

Labiobarbus leptocheilus (Valenciennes, 1842)




ត្រី អាចម៍កុក

Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881)



ត្រី រៀលតុប

Gymnostomus siamensis (Sauvage, 1881)



ត្រី រៀលអង្កាម

Gymnostomus lobatus (Smith, 1945)

ព្រមុះស្រួច ឈរទៅមុខ
Snout pointed and projecting

រស់នៅក្នុងទន្លេ និងបឹង
Inhabits rivers and lakes

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ១០ ស.ម
Common size < about 10 cm SL

ខ្លួនស្រលូនពណ៌ប្រាក់
Body plain silver, slender

KH LA TH VN




ត្រី រៀលអំពិល

Gymnostomus lineatus (Smith, 1945)


មានឆ្និតមួយចំនួន
Several stripes

រស់នៅតាមទន្លេ និងស្ទឹងធំៗ
Inhabits large rivers and stream

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ១៥ ស.ម
Common size < about 15 cm SL



KH LA TH VN



ត្រី ផ្កាចារ

Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878


អង្កត់ខ្មៅនៅលើព្រួយទ្រូង
A dark bar above pectoral fin

រស់នៅតាមទន្លេ និងស្ទឹងធំៗ
Inhabits large rivers and stream

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនដល់ប្រហែល ១៥ ស.ម
Size to about 15 cm SL

ខ្លួនខ្ពស់ ពណ៌ប្រាក់
Body relatively deep, silver


KH LA TH VN



ជានិច្ចក្រហម
Always red


ត្រី ប៉ាកែង

Cirrhinus prosemion (Fowler, 1934)




ត្រី ក្រឡង់តណ្ហា

Cirrhinus cirrhosus (Bloch, 1795)



ត្រី ក្រឡង់ / ព្រល

Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878



ត្រី ប៉ារ៉ា

Labeo pierrei (Sauvage, 1880)

កូនត្រី
Juvenile




រស់នៅក្នុងទន្លេធំៗ
Inhabits large rivers

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៦០ ស.ម
Common size < about 60 cm SL

KH LA TH VN

ទ្រនុងទន់បែក ១១-១២
11-12 branched rays



ត្រី ហ្វី

Labeo rohita (Hamilton, 1822)

កូនត្រី
Juvenile



នាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ចិញ្ចឹម
Introduced from India for aquaculture


ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៨០ ស.ម
Common size < 80 cm SL

KH LA TH VN

ច្រមុះលេចចេញ
Snout projecting

ទ្រនុងទន់បែក ១២-១៤
12-14 branched rays

ផ្នែកក្រោមនៃក្បាលកោង
Ventral profile of head arched



ត្រី ក្រែក

Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849)

កូនត្រី
Juvenile



ខ្លួនខ្ពស់មាំ
Body deep, robust

ពណ៌ត្នោតស្រគាំទៅខ្មៅ
Color dark brown to black

រស់នៅតាមទន្លេ និងបឹងធំៗ
Inhabits large rivers and lakes

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ៤០ ស.ម
Common size < 40 cm SL


KH LA TH VN

ទ្រនុងទន់បែក ១១-១៨
15-18 branched rays




ត្រី ក្អែកព្រួយ

Labeo barbatulus (Sauvage, 1878)




ត្រី ប៉ាសេអ៊ី

Mekongina erythrospila Fowler, 1937




ត្រី ប៉ាវ៉ាមុខពីរ

Incisilabeo behri (Fowler, 1937)




ត្រី លលកស

Osteochilus schlegelii (Bleeker, 1851)




ត្រី គ្រំ

Osteochilus melanopleura (Bleeker, 1852)



ត្រី ក្រសមេម៉ាយ

Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842)



ត្រី ក្រស

Osteochilus lini Fowler, 1935

រស់នៅក្នុងបឹង និងទន្លេ

Inhabits rivers and lakes

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ១០ ស.ម

Common size < about 10 cm SL

អុតខ្មៅក្រាលៗក្បែរ

A faint dark spot on shoulder


KH

LA

TH

ទ្រនុងទន់បែក ១២-១៥

12—15 branched rays



ត្រី ក្រសឆ្កឹក

Osteochilus microcephalus (Valenciennes, 1842)

រស់នៅក្នុងបឹង និងទន្លេ

Inhabits rivers and lakes

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួន

ទូទៅ < ១០ ស.ម

Common size

< about 10 cm SL

ដុំពកធំមួយនៅលើចុងច្រមុះ

A large tubercle on tip of snout

KH

LA

TH


VN

ទ្រនុងទន់បែក ១០-១៣

10—13 branched rays

ឆ្នុតខ្មៅមួយពីច្រមុះដល់គល់ព្រុយកន្ទុយ

A dark stripe from snout to caudal fin base



ត្រី ក្រសក្រហម

Osteochilus waandersii (Bleeker, 1853)

ឆ្នុតខ្មៅពីគម្របស្រកដល់ចុងកណ្តាលព្រុយកន្ទុយ

Black stripe from gill cover to end of middle of caudal fin

KH

LA

TH

រស់នៅតាមស្ទឹងមានទឹកហូរ


Inhabits flowing streams

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ២០ ស.ម

Common size < 20 cm


ជាទូទៅព្រុយក្រហម លើកលែងតែព្រុយទ្រូង

Fins always red except for pectoral fin




ត្រី រនាងស

Onychostoma sp.




ត្រី រនាងឆ្លុត

Onychostoma meridionale Kottelat, 1998




ត្រី រនាងឆ្លុត

Lobocheilos rhabdoura (Fowler, 1934)




ត្រី គល់ចេក

Epalzeorhynchos frenatum (Fowler, 1934)




ត្រី ជញ្ជក់ស្នែង

Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000



ត្រី ជញ្ជក់ស្នែងតូច

Crossocheilus oblongus Kuhl & van Hasselt, 1823



ត្រី ចង្វាជញ្ជក់

Crossocheilus reticulatus (Fowler, 1934)

រស់នៅតាមទឹកហូរថ្លា

Inhabits clear flowing waters

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនដល់ប្រហែល ១២ ស.ម

Size to about 12 cm SL

ខ្លួនស្រលូន
Body slender

មាត់នៅខាងក្រោម
Mouth subterminal

អុចធំ
A large spot

KH LA TH VN

ត្រី ចង្វាអង្ករមុខពីរ

Garra fuliginosa Fowler, 1934

រស់នៅតាមស្ទឹងដែលមានទឹកហូរលឿន

Inhabits fast-flowing streams


ច្រមុះមានគន្លាក់
Snout notched

ស្តង់ដារប្រវែងដងខ្លួនទូទៅ < ១៥ ស.ម

Common size < 15 cm SL

មានអុចខ្ចៅព្រាលៗ នៅគល់ព្រួយកន្ទុយ
A faint dark spot on caudal peduncle

KH LA TH




ផ្នែកខាងពោះនៃក្បាល
Ventral view of head

បបូរមាត់ខាងក្រោមរាងមូលសំប៉ែត
(ទូទៅចំពោះប្រភេទ *Garra* spp.)
Lower lip forming a disc
(common status in *Garra* spp.)

ត្រី ចង្វារអង្គរ

Garra cambodgiensis (Tirant, 1984)



ត្រី ចង្វារអង្គរភ្នំ

Garra fasciacauda Fowler, 1937

